

Biosecurity (Lightas-Kalikasan) sa Backyard (paligid ninyo)

6 na Paraang Pamigil ng Sakit mula sa Poultry (ibon gaya ng manok, itik, pabo, atbp.)

1

Huwag Lapitan.

Ipagbawal ang pasok-labas sa lupang-ari ninyo at sa mga ibon ninyo. Isipin ninyong bakuran ang kinaroroohan ng mga ibon ang lumikha ng pang-hiwalay na puwang kung maari. Payagan lamang ang mga nag-aalaga ng mga ibon na maki-ugnay sa mga ito. Kung may mga bisita na may dalang ibon nila, ipagbawal ang pag-lapit nito sa mga ibon ninyo. Ang mga mailap na ibon at mga ligaw ng itik at gansa ay hindi dapat maki-ugnay sa kawan ninyo dahil ang mga ito ay maaring nagdadalat ng mga mikrobyo at sakit.



2

Ipanatiling Malinis.

Gumamit ng malinis na damit, kuskusin ang sapatos ninyo ng disinfectant (pamatay ng mikrobyo), at hugasan ang mga kamay ng mahusay bago dumalaw sa kinaroroohan ng mga ibon ninyo. Linisin ang mga kulungan at i-disinfect ang mga kasangkapan na nadadait sa mga ibon at kanilang mga dumi, kasama ang mga kulungan at kagamitan. Tanggalin ang mga ipot bago mag-disinfect. Itapon sa tamang paraan ang mga patay ng ibon.



3

Huwag Dalhin ang Sakit sa Tahanan.

Kung naki-ugnay kayo sa mga ibon o mga taong may-ari ng ibon, kagaya ng sa bilihang patukain, linisin at i-disinfect ang mga gulong ng kotse at truck, kulungan ng mga ibon, at kasangkapan bago umuwi. Dinala ba ninyo ang ibon ninyo sa perya o exhibition? Ihiwalay ang mga ito sa iba sa kawan nang di-kukulang ng 2 linggo pagkalipas ng perya. Ang mga bagong ibon ay dapat ihiwalay sa kawan nang di-kukulang ng 30 na araw.



4

Huwag Humiram ng Sakit sa Kapit-Bahay Ninyo.

Huwag maki-sosyo ng kasangkapang pang-damo at pang-hardin, kagamitan, o materyales pang-poultry sa kapit-bahay ninyo o ibang may-ari ng ibon. Kung inuuwi ninyo ang mga bagay nito, linisin at i-disinfect ang mga ito bago i-uwi.



5

Kilalanin ang mga Hudyat na Babala ng Nakakahawang Sakit ng Ibon.

- Biglang pagdami ng namamatay sa mga ibon sa kawan ninyo.
- Pagbabahin, paghihingal, pag-uubo at nag-uuhog.
- Malabnaw at kulay berdeng pagtatae.
- Nanghihina at walang ganang kumain.
- Humihina ang pangingitlog o malambot o manipis na di-tamang hugis na mga itlog.
- Namamaga sa paligid ng mga mata, leeg, and ulo.
- Nagkulay ube ang mga lambi, palong, at paa (AI)
- Pangginginig, lumalaylay ang mga pakpak, umiikot, pumipilipit ang ulo at leeg, o madalang ang pagkilos (END)


Ang maagang pagkilala ay mahalaga sa pagpil sa pagkalat ng sakit.



6

Magbigay-Alam Tungkol sa mga Maysakit na Ibon.

Huwag mag-hintay. Kung maysakit ang mga ibon ninyo o namamatay, tawagan ang malapit sa inyo na tanggapan ng cooperative extension, veterinarian (manggagamot ng hayop), ang State Veterinarian, o ang tanggapan ng U.S. Department of Agriculture (USDA) Veterinary Services para matutuhan ang sanhi. Ang USDA ay nagpapatakbo ng walang-bayad na hotline **(1-866-536-7593)** na may mga veterinarian upang tumulong sa inyo. Walang bayad ang paglingkod nito.



Kayo ang pinakamahusay na pananggol ng mga ibon ninyo.

Backyard Biosecurity

6 Ways To Prevent Poultry Diseases

1

Keep Your Distance.

Restrict access to your property and your birds. Consider fencing off the area where you keep your birds and make a barrier area if possible. Allow only people who take care of your birds to come into contact with them. If visitors have birds of their own, do not let them near your birds. Game birds and migratory waterfowl should not have contact with your flock because they can carry germs and diseases.



2

Keep It Clean.

Wear clean clothes, scrub your shoes with disinfectant, and wash your hands thoroughly before entering your bird area. Clean cages and change food and water daily. Clean and disinfect equipment that comes in contact with your birds or their droppings, including cages and tools. Remove manure before disinfecting. Properly dispose of dead birds.



3

Don't Haul Disease Home.

If you have been near other birds or bird owners, such as at a feed store, clean and disinfect car and truck tires, poultry cages, and equipment before going home. Have your birds been to a fair or exhibition? Keep them separated from the rest of your flock for at least 2 weeks after the event. New birds should be kept separate from your flock for at least 30 days.



4

Don't Borrow Disease From Your Neighbor.

Do not share lawn and garden equipment, tools, or poultry supplies with your neighbors or other bird owners. If you do bring these items home, clean and disinfect them before they reach your property.



5

Know the Warning Signs of Infectious Bird Diseases.

- Sudden increase in bird deaths in your flock
- Sneezing, gasping for air, coughing, and nasal discharge
- Watery and green diarrhea
- Lack of energy and poor appetite
- Drop in egg production or soft- or thin-shelled misshapen eggs
- Swelling around the eyes, neck, and head
- Purple discoloration of the wattles, combs, and legs (AI)
- Tremors, drooping wings, circling, twisting of the head and neck, or lack of movement (END)

Early detection is important to prevent the spread of disease.



6

Report Sick Birds.

Don't wait. If your birds are sick or dying, call your local cooperative extension office, local veterinarian, the State Veterinarian, or U.S. Department of Agriculture (USDA) Veterinary Services office to find out why. USDA operates a toll-free hotline (**1-866-536-7593**) with veterinarians to help you. There is no charge for this service.



You are the best protection your birds have.